

FICHA TÉCNICA

SUNFIX 300

Paraquat + Diuron
Suspensión acuosa**COMPOSICIÓN**

PARAQUAT: Sal dicloruro del ion 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio: 25.0%

DIURON: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea: 8.860%

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-MEZC-1229-303-008-034

FUNCIÓN

SUNFIX 300 es un herbicida líquido de contacto no selectivo que actúa destruyendo la clorofila. Por lo tanto, destruye todos los vegetales verdes con los que llega a tener contacto, ya sean malas hierbas o plantas cultivadas.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
APARIENCIA	Líquido homogéneo
COLOR	Verde a Verde azulado
DENSIDAD	1.08 g/mL
SOLUBILIDAD	Soluble en agua
pH	5.0-7.0

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	MALEZA		DOSIS (L/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Maíz (SL) Sorgo (SL) Caña de azúcar (SL)	Anisillo	<i>Schkuhria pinatta</i>	2.0-5.0
	Aceitilla	<i>Bidens pilosa</i>	
	Chichiquelite	<i>Bidens odorata</i>	
	Zacate Ancho	<i>Pennisetum sp</i>	

Dirigir la aplicación a las malezas en crecimiento activo. (Entre 5 y 15 cm de altura). Utilice campana protectora.

(I) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite



MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Antes de usar el producto agite el envase, abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio separado, agregue agua hasta un tercio de la capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **SUNFIX 300** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar, vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES

En aplicaciones terrestres, aplique la dosis alta cuando la vegetación sea densa o en el primer tratamiento. **SUNFIX 300** destruye todos los tejidos verdes. No aplique 5 L/ha al año.

FITOTOXICIDAD

SUNFIX 300 debe aplicarse en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida selectivo.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

SUNFIX 300 se puede mezclar con herbicidas residuales siempre y cuando estén autorizados para su uso en cultivos indicados.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

