

FICHA TECNICA

COSECHA FIX PLUS



ANÁLISIS GARANTIZADO

Fósforo (P ₂ O ₅)	41.0%
Potasio (K ₂ O)	52.0%
Pureza	98.0%
Apariencia	Polvo blanco
Solubilidad (agua, 20°C, pH 5.4)	150 g/L
Punto de fusión (°C)	465
pH (solución 1 g/L, 20°C)	8.7-9.3
Insolubles	0.5%



INFORMACIÓN GENERAL

COSECHA FIX PLUS brinda una nutrición robusta a los cultivos por su contenido de fósforo y potasio, con una reacción alcalina en el suelo. Es considerado un fertilizante óptimo para el ciclo de crecimiento del cultivo. Facilita la producción de materia seca, desarrollo de la planta e incremento de los grados Brix, mientras que controla su crecimiento.

Los beneficios que se obtienen de su aplicación son: Plantas vigorosas, frutos de mejor calidad y mejor rendimiento por hectárea.



USOS EN CULTIVOS

CULTIVO	DOSIS	No. DE APLICACIONES
Acelga, col, coliflor, brócoli, lechuga y espinaca	Foliar: 0.5 a 1.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Iniciar las aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo (10 días después del nacimiento o del trasplante de la planta y continuar con los tratamientos cada 15 días.
	Hidroponía: 1 a 2 Kg por cada 10 m ³ de agua	En el cultivo hidropónico la dosis de 1.0 Kg se aplica al iniciar la floración y la de 2.0 Kg desde este momento hasta una semana antes de la cosecha del cultivo.



	Fertiirrigación: 1 a 2 Kg por cada 10 m ³ de agua	En fertiirrigación se comienza a aplicar a los 5 días después del trasplante durante 10 semanas. En caso de carencias se aplica la dosis de 2.0 Kg y repetir cada 5 días hasta la desaparición de los síntomas de carencia (máximo hacer de 3 a 4 aplicaciones por ciclo).
Chile y Jitomate	Foliar: 0.5 a 1.0 Kg/ha	Aplicación foliar: la primera aplicación al momento del trasplante dirigido al cuello de la plántula posteriormente una segunda aplicación durante el desarrollo de la planta en los 15 a 21 días después de la primera aplicación y realizar dos tratamientos más durante el desarrollo de la planta hasta que inicie la floración.
	Hidroponía: 1 a 2 Kg por cada 10 m ³ de agua	En el cultivo hidropónico las dosis más bajas se aplican en la floración y las más altas desde el momento hasta la maduración.
	Fertiirrigación: 1 a 2 Kg por cada 10 m ³ de agua	En fertiirrigación se comienza a aplicar a los 5-7 días del trasplante cada semana, durante 10 semanas. En caso de carencias se duplican las dosis y repetir cada 5 días hasta la desaparición de los síntomas de carencia (3-4 aplicaciones).
Ajo y cebolla	Foliar: 0.5 a 1.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Iniciar las aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo (10 días después del nacimiento o del trasplante de la planta y continuar con los tratamientos cada 15 días durante el desarrollo vegetativo y hasta antes de la formación del bulbo o cabeza.
Fresa	Foliar: 0.5 a 1.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Iniciar las aplicaciones al inicio vegetativo (10 días después del nacimiento o del trasplante de la planta y continuar con los tratamientos cada 15 días.



Papa	Foliar: 1.5 a 2.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Iniciar las aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo 10 días después del nacimiento de la planta y continuar con los tratamientos cada 15 días hasta la formación de tubérculos.
Tabaco	Foliar: 1.5 a 2.0 Kg/ha	Aplicación foliar: hacer la primera aplicación cada 15 días después del trasplante y continuar con tratamientos a intervalos de 15 a 21 días, hasta antes del corte.
Alfalfa	Foliar: 1.5 a 2.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Iniciar las aplicaciones después de la aparición de las primeras hojas verdaderas y continuar con los tratamientos quincenales durante el desarrollo vegetativo y repetir la aplicación cada 15 días después de cada corte.
Leguminosas (frijol, chícharo, haba, cacahuate)	Foliar: 1.5 a 2.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Realizar la primera aplicación a los 15 días después de la emergencia y hacer dos tratamientos más hasta la floración.
Ornamentales	Foliar: 0.5 a 1.0 Kg/ha	Aplicación foliar: Iniciar las aplicaciones al inicio del desarrollo vegetativo (5 días después del trasplante de la planta) y continuar con los tratamientos cada 15 días.
	Fertiirrigación: 1 a 2 Kg por cada 10 m ³ de agua	En fertiirrigación se comienza a aplicar a los 5 días después del trasplante durante 10 semanas. En caso de carencias se aplica la dosis de 2.0 Kg y repetir cada 7 días hasta la desaparición de los síntomas de carencia.



MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicarse por fertiirrigación o por vía foliar. Apoyado por unas tijeras o navaja, abra el saco por la parte marcada y extraiga el contenido necesario para la aplicación, pese la cantidad establecida en una balanza y vacíelo al recipiente con agua limpia, para elaborar la solución nutritiva.





COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala, antes de realizar la mezcla general.



AVISO DE GARANTÍA

Fertilizantes e Hidrosolubles de México, S.A. de C.V. garantiza que el contenido del envase se encuentra conforme a las especificaciones de la etiqueta. Dado a que el uso del producto está fuera de su control, no se da garantía expresa ni implícita sobre los resultados y/o efectos inherentes a su uso, tanto si se utiliza o no bajo las indicaciones recomendadas. El comprador acepta todos los riesgos del uso y manejo del producto.

