

FICHA TÉCNICA

Manto[®] 420
mancozeb

Fungicida / Suspensión concentrada

Mancozeb
Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN

Mancozeb: 33.6%

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-FUNG-0322-399-064-034

FUNCIÓN

MANTO 420 es un fungicida de contacto con acción protectora a base de Mancozeb para el control de enfermedades.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
Apariencia	Líquido viscoso color amarillo opaco
Densidad (g/mL)	1.250-1.290

USO EN CULTIVOS

Úsese exclusivamente en los cultivos y enfermedades aquí recomendados.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	INDICACIONES
Jitomate (5)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0-3.0	Inicie la aplicación cuando las plantas tengan de 10 a 15 cm de altura. Repita en intervalos de cada 7 a 10 días.
Papa (7)			
Plátano (1)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijensis</i> Var. <i>Difformis</i>)	2.5-3.5	El intervalo entre ciclos y la dosis dependen de las condiciones imperantes del clima y de la incidencia de la enfermedad. Se recomienda un intervalo entre ciclos no menor de 8 días.
	Sigatoka amarilla (<i>Mycosphaerella musicola</i>)		

() Intervalo de Seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de haber aplicado el producto.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **MANTO 420** siempre utilice equipo de protección personal completo para realizar con seguridad las operaciones (overol o camisa de manga larga y pantalón largo, mascarilla con respirador, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). Para la aplicación de **MANTO 420** es factible utilizar equipos convencionales de aplicación, tanto aéreos como terrestres, se recomienda utilizar de 200 - 400 L/ha en el caso de equipos terrestres y 10 - 25 L/ha de agua en caso de equipos aéreos. Preparar la solución de aplicación bajo las siguientes instrucciones: Aplicación en suspensión (agua): Bajo agitación constante, vierta la cantidad de producto a usar en el tanque de mezcla con agua. Aplicación en emulsión (aceite y agua): Bajo agitación constante, mezcle en el siguiente orden: Parte del agua a usar + **MANTO 420** + aceite + resto del agua. A las dosis recomendadas no es necesario usar emulsificantes ni otros agentes tensoactivos.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No mezcle **MANTO 420** con productos de reacción alcalina como arseniato de calcio o caldo bordelés, ni con aceites. La mezcla deberá hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos indicados en esta etiqueta.

FITOTOXICIDAD

MANTO 420 no es fitotóxico en los cultivos y dosis aquí recomendados.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes métodos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.